

# DICLOMED®

0,74 mg/ml collutorio

DICLOFENAC

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

## **CONTENUTO DI QUESTO FOGLIO:**

1. Cos'è Diclomed e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Diclomed
3. Come usare Diclomed
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Diclomed
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **1. COS'È DICLOMED E A CHE COSA SERVE**

Diclomed contiene il principio attivo diclofenac che appartiene ad una classe di medicinali chiamati farmaci antinfiammatori non steroidei. Questo medicinale è indicato nel trattamento dei sintomi di irritazione o infiammazione che comportano dolore a livello di bocca o gola, ad esempio infiammazioni delle gengive, della mucosa orale o della faringe (gengiviti, stomatiti, faringiti). Diclomed può essere utilizzato anche quando questi sintomi sono conseguenti alla terapia dentaria per la cura o l'estrazione di denti.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

### **2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI USARE DICLOMED**

#### **Non usi Diclomed**

- se è allergico al diclofenac o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale

(elencati al paragrafo 6);

- se è allergico all'acido acetilsalicilico (aspirina) o ad altri medicinali simili (farmaci antinfiammatori non steroidei)

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Diclomed.

L'uso, specie se prolungato, dei preparati per uso locale può dar luogo a fenomeni di tipo allergico. Se ciò dovesse accadere, interrompa il trattamento con Diclomed e si rivolga al medico per istituire, se necessario, una terapia adatta.

L'eventuale deglutizione involontaria della dose di soluzione impiegata per sciacqui e gargarismi non le comporta alcun danno in quanto equivale a un quinto/sesto della dose prevista per via sistemica (assunzione orale o per iniezione).

#### **Altri medicinali e Diclomed**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni negative con altri medicinali.

#### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale. Durante la gravidanza e nel periodo di allattamento al seno usi Diclomed solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

#### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono noti effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

#### **Diclomed contiene sodio benzoato (E211)**

Sodio benzoato può causare irritazione locale. Diclomed 0,74 mg/ml Collutorio contiene 2000 mg di sodio benzoato (E211) in 200 ml, equivalenti a 10 mg/ml.

### 3. COME USARE DICLOMED

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2-3 sciacqui o gargarismi al giorno con 1 misurino (15 ml) di collutorio puro o diluito in poca acqua.

#### Se usa più Diclomed di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio con Diclomed. In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Diclomed avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

#### Se dimentica di usare Diclomed

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose precedente.

#### Se interrompe il trattamento con Diclomed

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### 4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Diclomed 0,74 mg/ml collutorio è generalmente ben tollerato e raramente si manifestano effetti indesiderati.

#### Effetti indesiderati di entità lieve:

- ▶ irritazioni all'interno della bocca

#### Altri effetti indesiderati:

- ▶ tosse

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### 5. COME CONSERVARE DICLOMED

Conservi questo medicinale fuori della vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Conservi a temperatura non superiore ai 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### 6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

#### Cosa contiene Diclomed

- ▶ Il principio attivo è diclofenac acido. 1 ml di collutorio contiene 0,74 mg di diclofenac acido.
- ▶ Gli altri componenti sono: sorbitolo, colina cloruro, sodio idrossido, sodio benzoato (E211), sodio edetato, acesulfame potassico, olio essenziale di menta, pesca aroma naturale, colorante E129, acqua depurata.

#### Descrizione dell'aspetto di Diclomed e contenuto della confezione

Diclomed si presenta sotto forma di collutorio. Flacone da 200 ml.

#### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Farmaka s.r.l. – Via Villapizzone, 26 – 20156 Milano (MI)

#### Produttore

Doppel Farmaceutici Srl  
Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

ITC Farma Srl  
Via Pontina, Km 29 - 00071 Pomezia (RM)  
Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 09/2022**

FKIFIDC001