

# Altan<sup>®</sup>

**30 mg** compresse rivestite con film

PROMELASI

## **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**

Altan è un preparato a base di Promelasi, enzima che ha dimostrato di possedere una spiccata attività antinfiammatoria, secretolitica e anti-edemigena.

## **INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Come coadiuvante nelle affezioni respiratorie acute e croniche, quale secretolitico, e nelle infiammazioni, tumefazioni ed edemi in più settori terapeutici e precisamente:

Traumatologia-Ortopedia-Chirurgia: fratture, edemi ed ematomi post-traumatici e post-operatori.

Odontoiatria: processi periapicali, ascessi alveolo gengivali, dopo avulsioni dentali, disodontiasi.

Otorinolaringoiatria: flogosi acute e croniche della mucosa nasale e dell'orecchio.

Angiologia: tromboflebiti.

Ostetricia e ginecologia: ingorgo mammario, episiotomia.

Urologia: cistiti.

## **CONTROINDICAZIONI**

Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti.

Soggetti con emofilia e con diatesi emorragiche, epatopatie e nefropatie gravi, ulcera peptica.

## **PRECAUZIONI PER L'USO**

Vedere Gravidanza e allattamento.

## **INTERAZIONI**

Informare il medico o il farmacista se si ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Non sono stati effettuati studi di interazione.

## **AVVERTENZE SPECIALI**

### **Gravidanza e allattamento**

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico.

## **EFFETTI SULLA CAPACITÀ DI GUIDARE VEICOLI E SULL'USO DI MACCHINARI**

Altan non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

## **DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE**

Adulti: 1 - 3 compresse al giorno, suddivise in 2 o più somministrazioni nell'arco delle 24 ore.

## **SOVRADOSAGGIO**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Altan avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Non sono stati riportati casi di intossicazione.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Altan, si rivolga al medico o al farmacista.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, Altan può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Altan è generalmente ben tollerato; sono stati segnalati lievi disturbi gastrointestinali e in soggetti predisposti reazioni cutanee di natura allergica.

Gli effetti indesiderati vengono riportati secondo le seguenti categorie di frequenza secondo MedDRA: molto comune ( $\geq 1/10$ ); comune (da  $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ); non comune (da  $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ ); rara (da  $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ ); molto rara ( $\leq 1/10.000$ ); non nota (non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione sistemica organica	Molto comune ≥1/10	Comune da ≥1/100 a ≤1/10	Non comune da ≥1/1.000 a ≤1/100	Rara da ≥1/10.000 a ≤1/1.000	Molto rara ≤1/10.000	Non nota
<i>Disturbi del metabolismo e della nutrizione</i>						Anoressia
<i>Patologie gastrointestinali</i>						Gastralgia Pirosi gastrica Nausea Vomito Diarrea
<i>Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo</i>						Reazione cutanea allergica

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

**Scadenza:** vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

**Attenzione non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.**

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.**

### **COMPOSIZIONE**

Ogni compressa rivestita con film contiene:

**PRINCIPIO ATTIVO**

Promelasi 30 mg.

**ECCIPIENTI**

Maltosio, Calcio carbossimetilcellulosa, Magnesio stearato, Copolimero dell'acido metacrilico, Trietilcitrato, Talco, Sodio idrossido.

### **FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Comprese rivestite con film.

Astuccio da 20 compresse.

### **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Farmaka srl - Via Villapizzone, 26 - 20156 Milano

### **PRODUTTORE**

Farmaceutici Formenti S.p.A. - Via Giuseppe di Vittorio, 2 - 21040 Origgio (VA)

### **REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

Settembre 2019